

## TOS DE LAS PERRERAS

### ¿QUÉ ES?

También llamada "**Traqueobronquitis infecciosa canina**", es una enfermedad muy similar al catarro en humanos. Es altamente contagiosa y puede afectar a perros de cualquier edad, tamaño y raza.

La enfermedad está causada principalmente por dos agentes infecciosos, Bordetella bronquiseptica y el virus de Parainfluenza tipo 2. Tales agentes destruyen el tejido del aparato respiratorio del perro generando una **tos seca e intensa** que puede persistir desde varios días a unas semanas.

### ¿QUÉ SINTOMAS PRESENTAN?

Los signos más comunes son tos seca improductiva y áspera. También se puede dar mucosidad nasa, fiebre, decaimiento, anorexia y dificultad respiratoria. En algunas ocasiones puede llegar a complicarse con una neumonía severa sobre todo en animales que estén más débiles (inmunodeprimidos, cachorros,...)



### ¿CÓMO SE CONTAGIA?

Las actividades sociales que desarrolla tu mascota favorecen la enfermedad, que se transmite de manera muy sencilla todo el año. Las secreciones oculares, nasales y bucales son portadoras de muchos gérmenes, y son precisamente estas partículas, que por contacto directo, como olfateo entre animales, o llevadas por el viento, tienen una capacidad altamente infectante.

El contagio se da sobre todo en parques, guarderías y albergues. También en competiciones y exhibiciones o en zonas destinadas a la cría. Por lo tanto es una patología social, de perros que contactan habitualmente con otros perros.

## ¿CÓMO SE DIAGNOSTICA?

La valoración de los signos clínicos junto al historial nos ayudarán a diagnosticar la enfermedad. A veces, si la enfermedad es más grave, puede ser aconsejable realizar radiografía de tórax o analítica sanguínea.

## ¿CÚAL ES EL TRATAMIENTO?

El tratamiento variará en función de la gravedad del caso. En los casos más leves, la tos suele desaparecer en 15 o 20 días, aunque a veces es aconsejable el uso de medicamentos para disminuir la tos. En los casos más graves se necesitarán antibióticos e incluso hospitalización del paciente.

## ¿CÓMO SE PUEDE PREVENIR?

Las relaciones sociales que desarrolla tu mascota son altamente necesarias para su salud mental y la buena convivencia dentro de la familia. Por este motivo la prevención vacunal es necesaria si quieres evitar esta enfermedad.



Es recomendable para aquellas mascotas que frecuentan parques o suelen estar en contacto con otros perros. También es aconsejable para todos aquellos que vayan a ser alojados en residencias caninas, que participen en exhibiciones o vayan a asistir a clases de adiestramiento.

La **vacunación anual** frente a la traqueobronquitis infecciosa protegerá a tu perro de una manera completa y sencilla. Su inmunidad comienza a los pocos días de inyectar la vacuna, y permanece durante el siguiente año. Se pueden vacunar los cachorros a partir de la 4ª semana de edad e incluso hembras en gestación.

## RECUERDA

LA VACUNACIÓN ES LA MEJOR MANERA DE PREVENCIÓN.

TU VETERINARIO TE ACONSEJARÁ SOBRE EL PLAN PREVENTIVO MÁS ADECUADO EN TU CASO.